

جدول عقاقير فيروس نقص المناعة (HIV) لعام ٢٠١١ العقاقير المعتمدة لعلاج فيروس نقص المناعة (HIV)



يحتوي جدول العقاقير على علاجات مضادات الفيروسات القهقرية لعلاج فيروس نقص المناعة (HIV). يوفر الجدول اسم العقار والجرعات والمعلومات المهمة عن الأعراض الجانبية (العقاقير معروضة ليست بحجمها الطبيعي). للتعرف على مزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة معلومات نشرة كل عقار. مقدم من Sense، إحدى المنشورات الإلكترونية لجمعية MSMGF: www.msmgf.org

مثبطات المنتسخة العكسية النوكليوزيدية/النوكليوتيدية (NRTI)

العقار	الجرعة	الأعراض الجانبية ومعلومات أخرى مهمة
Emtriva Gilea Sciences الاسم العلمي: زيدوفويدين	كبسولة ٢٠٠ ملليجرام مرة واحدة في اليوم. ومتوفر في شكل شراب.	الأعراض الجانبية: صداع، إسهال، غثيان، شحوب في الجلد ما بين خفيف إلى مُعتدل، واحمرار. يمكن أن يؤخذ مع تناول الطعام أو بدونه. عقار Emtriva® مشابه جدًا لعقار Epivir®. المرضى المقاومون لعقار Epivir® لديهم على الأرجح مقاومة لعقار Emtriva®.
Epivir ViiV Healthcare الاسم العلمي: لاميفودين	قرص ٣٠٠ ملليجرام مرة واحدة في اليوم أو قرص ١٥٠ ملليجرام مرتين يوميًا. ومتوفر في شكل شراب.	الأعراض الجانبية: صداع، إعياء، غثيان، إسهال، أرق، انخفاض كرات الدم البيضاء (قلة العدلات)، انخفاض كرات الدم الحمراء (الأنيميا "فقر الدم")، التهاب البنكرياس، وتساقط الشعر. يمكن أن "تعود" مقاومة فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) لعقار الأزيدوثايميدين (AZT)، إذا تم استخدامها معًا. تجنب تعاطي الكحول. تحقق من ثلاثي الغليسريد، خاصة في الأطفال، للتحقق من مخاطر التهاب البنكرياس. يمكن أن يؤخذ مع تناول الطعام أو بدونه.
Retrovir ViiV Healthcare الاسم العلمي: زيدوفويدين	قرص ٣٠٠ ملليجرام مرتين يوميًا. ومتوفر في شكل شراب.	الأعراض الجانبية: انخفاض كرات الدم الحمراء (الأنيميا "فقر الدم")، انخفاض كرات الدم البيضاء، صداع، غثيان، ألم، تورم وتلف العضلات، شحوب لون الأظفار. كن حذرًا في تعاطي العقار مع الأنيميا (فقر الدم). يمكن أن يؤخذ مع تناول الطعام أو بدونه. يمكن تخفيف تقلصات المعدة إذا أخذ العقار مع تناول الطعام. تجنب تعاطي العقار مع عقار Zerit®. يُستخدم أيضًا لمنع انتقال العدوى في الفترة أثناء الحمل وبعد الولادة (من الأم إلى الطفل).
Videx EC بريستول مايرز سكويب الاسم العلمي: ديدانوسين	كبسولة مُغلقة ٤٠٠ ملليجرام مرة واحدة يوميًا أو كبسولة ٢٥٠ ملليجرام للمرضى الذين يقل وزنهم عن ١٣٢ رطل (٦٠ كيلوجرام). ويتوفر في شكل مسحوق.	الأعراض الجانبية: اعتلال الأعصاب الطرفية، الإحساس بوخز، تخدر أو ألم في اليدين والقدمين، تغيرات في شبكية العينين، التهاب البنكرياس، غثيان، إسهال، صداع، قيء وجفاف الجلد. يجب تناول العقار سواء كان في شكل كبسولات أو مسحوق قبل الأكل بساعة على الأقل أو بعد الأكل بساعتين. تجنب استخدام الأقراص المضادة للحموضة مع الألومنيوم إذا تم تناول الكبسولات أو المسحوق، عندما يُقترن تناول العقار مع عقار Viread®، ينبغي خفض الجرعة إلى ٢٥٠ ملليجرام يوميًا.
Viread جلعاد سينسيز الاسم العلمي: تينوفوفير DF	قرص ٣٠٠ ملليجرام مرة واحدة يوميًا.	الأعراض الجانبية: غثيان، قيء، إسهال، صداع وضعف العظام. يرجى فحص وظائف الكلى. يمكن أن يؤخذ مع أو تناول الطعام أو بدونه. عندما يُقترن تناول العقار مع عقار Videx®، ينبغي خفض جرعة Videx® إلى ٢٥٠ ملليجرام يوميًا.
Zerit بريستول مايرز سكويب الاسم العلمي: ستافودين	كبسولة ٤٠٠ ملليجرام مرتين يوميًا. أو (كبسولة ٣٠٠ ملليجرام مرتين يوميًا للمرضى الذين يقل وزنهم عن ١٣٢ رطل (٦٠ كيلوجرام) أو أقل).	الأعراض الجانبية: اعتلال الأعصاب الطرفية، الإحساس بوخز، تخدر أو ألم في اليدين والقدمين، التهاب البنكرياس، أرق، صداع، غثيان وإسهال. تشير بعض الأدلة إلى أنه يجب ألا يؤخذ مع عقار الأزيدوثايميدين (AZT). يمكن أن يؤخذ مع تناول الطعام أو بدونه.
Ziagen ViiV Healthcare الاسم العلمي: أباكافير سولفات	كبسولة ٣٠٠ ملليجرام مرتين يوميًا أو كبسولتين ٣٠٠ ملليجرام مرة واحدة يوميًا. ومتوفر في شكل شراب.	الأعراض الجانبية: حساسية مُفرطة (تفاعلات تحسسية حادة)، غثيان، قيء، ضيق في التنفس، آلام في البطن، حمى و/أو طفح جلدي. المرضى الذين يعانون من تلك الآثار الجانبية في غضون ستة أسابيع بعد بدء العلاج بعقار Ziagen® ربما يعانون من فرط الحساسية، وينبغي استشارة الطبيب الخاص بهم على الفور. كما يجب التوقف عن استخدام العقار بعد تشخيص أي تفاعل حساسية. وبمجرد التوقف عن تناول عقار Ziagen®، يجب ألا تتناول هذا العقار لأنه يمكن أن يكون قاتلاً. يمكن أن يؤخذ مع تناول الطعام أو بدونه.

مثبطات المنتسخة العكسية غير النوكليوزيدية (NNTIR)



Edurant جانسن الاسم العلمي: ريليفيرين	قرص ٢٥ ملليجرام مرة واحدة يوميًا.	الأعراض الجانبية: أرق، اكتئاب، ارتفاع في نتائج اختبارات وظائف الكبد، ارتفاع في نسبة الكرياتينين في الدم. يمكن أن يكون أقل قوة إذا كان الأساس HIV RNA < ١٠٠,٠٠٠ نسخة/ملييلتر. يتطلب بيئة حمضية في المعدة للامتصاص الجيد: يجب أن يؤخذ مع الطعام. ممنوع استخدامه مع مثبطات مضخة البروتون. يجب على المرضى الذين يتناولون عقار ريليفيرين تناول الأدوية المضادة للحموضة والمقللة لها (H2 blockers) في وقت معين.
Intelence تبيوتيك الاسم العلمي: إترافيرين	قرصان ١٠٠ ملليجرام مرتين يوميًا.	الأعراض الجانبية: تفاعلات جلدية حادة، متلازمة حالات ستيفينس جونسون، حساسية مُفرطة، يجب التوقف عن استخدام العقار في حالات الطح الجلدي الحادة. يجب تناول العقار بعد الأكل. ينبغي ألا يعطى دواء Intelence مع مضادات الفيروسات القهقرية التالية: تيبيرانافير/ريتونافير، فوزام برينافير/ريتونافير، أتازانافير/ريتونافير، مثبطات البروتياز التي ليس لها ريترونافير ومثبطات للمنتسخة العكسية غير نوكليوزيدية (NNRTI).
Rescriptor ViiV Healthcare الاسم العلمي: ديلافيردين ميزيلات	قرصان ٢٠٠ ملليجرام ثلاث مرات يوميًا.	الأعراض الجانبية: طفح جلدي، صداع، إعياء، غثيان، ارتفاع في إنزيمات الكبد. يجب أخذ العقار قبل أو بعد تناول عقار Videx® أو الأقراص المضادة للحموضة بساعة على الأقل. يرفع مستويات الدم لبعض مثبطات البروتياز. اتصل بطبيبك الخاص إذا كنت تعاني من الطفح الجلدي. يمكن أن يؤخذ مع تناول الطعام أو بدونه.

<p>الأعراض الجانبية: الأعراض المرتبطة بالجهاز العصبي المركزي (CNS): دوار، خمول، أرق، أحلام اليقظة، انخفاض التركيز، الشعور بعدم الاستقرار والطفح الجلدي. يجب تناول عقار Sustiva قبل النوم للحد من الأعراض الجانبية المحتملة. قد يتسبب في انخفاض مستويات الدم لبعض مثبّطات البروتياز (PI) ويزيد أخرى. يقلل كل من الريفامبين والكلاريثروميسين من مستويات عقار Sustiva. تجنب استخدام الكحول وممارسة الأنشطة التي تتطلب التركيز. ينبغي للمرأة استخدام وسيلة منع الحمل بسبب خطر إحق الضرر بالجنين. تجنب الأغذية الدهنية. يفضل تناول العقار على معدة فارغة.</p>	<p>قرص ٦٠٠ مليجرام مرة يوميًا أو ٣ كبسولات ٢٠٠ مليجرام يوميًا.</p>	<p>Sustiva بريستول مايرز سكويب الاسم العلمي: إيفافيرنز (كما يباع أيضًا باسم Stocrin في بعض الدول)</p>	
<p>الأعراض الجانبية: طفح جلدي، اضطرابات بالمعدة، صداع، انخفاض كرات الدم البيضاء، زيادة إنزيمات الكبد. الجرعة المبدئية: قرص ٢٠٠ مليجرام مرة واحدة يوميًا في أول ١٤ يومًا. انخفاض مستويات مثبّطات البروتياز (PI). اتصل بطبيبك إذا كنت تعاني من طفح جلدي. يمكن أن يؤخذ مع تناول الطعام أو بدونه. ينبغي رصد إنزيمات الكبد، خاصة أثناء فترة الحمل. عندما يبدأ العلاج باستخدام عقار Viramune، كن حذرًا بعد الخلايا الثنائية T-cell. من غير المستحسن استخدام العقار للنساء اللاتي يرتفع لديهن عدد الخلايا إلى أعلى من ٢٥٠ خلية وللرجال الذين يرتفع لديهم عدد الخلايا إلى أعلى من ٤٠٠ خلية.</p>	<p>قرص ٢٠٠ مليجرام مرة واحدة يوميًا لمدة ٤ ايوماً ثم قرصين ٢٠٠ ملي مرتين يوميًا. ومتوفر في شكل شراب.</p>	<p>Viramune بوهنجر انجلهايم الاسم العلمي: نيفيرابين</p>	


مثبّطات البروتياز (PI)

<p>الأعراض الجانبية: غثيان، قيء، إسهال وطفح جلدي. يجب أن يؤخذ العقار مع تناول الطعام. يُستخدم بحذر من قبل المرضى الذين يعانون من التهاب الكبد. غير موصى باستخدام العقار من قبل المرضى الذين يعانون من أعراض فشل الكبد الخفيف إلى الحاد. قد يسبب مثبّط أنبثوث Aptivus نزيف داخل الجمجمة، فشل الكبد. اتصل فورًا بطبيبك الخاص إذا كنت تعاني من نزيف غير عادي أو نزيف بدون سبب. نزيف دون سبب واضح. يستخدم بحذر من قبل المرضى الذين يعانون من حساسية ضد عقاقير السلفا. يعمل العقار بشكل أفضل عندما يخلط بعقار Fuzeon. يجب تناول العقار مع الطعام فقط للمرضى الذين لديهم علاجات سابقة.</p>	<p>كبسولتان ٢٥٠ مليجرام مع كبسولتين ١٠٠ مليجرام Norvir مرتين يوميًا.</p>	<p>Aptivus بوهنجر انجلهايم الاسم العلمي: تيبيرانافير</p>	
<p>الأعراض الجانبية: حصى الكلى (أعراض قد تكون ألم في الظهر أو الجنب)، ارتفاع في مستويات البيليروبين (صبغة بيلي)، طفح جلدي، جفاف الجلد، تساقط الشعر، غثيان وإسهال. ينبغي تناول العقار مع احتساء (من ٦ إلى ٨ أكواب من الماء يوميًا) لتجنب تكون حصى الكلى. يمكن تناول عقار Norvir مع الطعام أو بدونه. للعقار تفاعلات دوائية عدة، اتصل بطبيبك للاستعلام عنها. لا يُنصح بخلط العقار مع عقار أتانافير.</p>	<p>كبسولتان ٢٥٠ مليجرام مع كبسولتين ١٠٠ مليجرام Norvir مرتين يوميًا.</p>	<p>Crixivan ميرك آند كمياني الاسم العلمي: أندينافير سولفات</p>	
<p>الأعراض الجانبية: غثيان، إسهال، انتفاخ البطن، آلام في البطن وصداع. ينبغي تناول العقار مع الطعام أو خلال ساعتين من تناول الطعام. ينبغي عدم تناول عقار Invirase مع عقار Norvir. انظر تفاعلات عقار Norvir.</p>	<p>قرصان ٥٠٠ مليجرام مع كبسولة Norvir ١٠٠ مليجرام مرتين يوميًا.</p>	<p>Invirase لا روش الاسم العلمي: ساكوينافير ميزيلات</p>	
<p>الأعراض الجانبية: ترسبات مائية، إسهال، غثيان، قيء، الشعور بالتعب أو الضعف. يحتوي هذا العقار على Norvir كما يشتمل على العديد من التفاعلات الدوائية. يُستخدم العقار بحذر من قبل المرضى المصابين بمرض التهاب الكبد الوبائي بي أو سي. لا يوجد تقييدات متعلقة بالنظام الغذائي. الأقرص لا تحتاج إلى تبريد. يوصى فقط بتناول الجرعة مرة واحدة يوميًا للمرضى الذين ليس لهم علاجات سابقة. إذا كان النظام العلاجي يشتمل على عقار Sustiva أو عقار Viramune، فإنه ينبغي تعديل جرعة كاليتر. يوصى فقط بتناول الجرعة مرتين يوميًا للمرضى الذين لهم علاجات سابقة لم تكمل بالنجاح مع أدوية أخرى. إذا كان النظام العلاجي يشتمل على عقار Sustiva أو عقار Viramune، فإنه ينبغي تعديل جرعة كاليتر.</p>	<p>٤ أقراص مرة واحدة يوميًا (يوصى به لطالبي العلاج لأول مرة)، أو قرصين مرتين يوميًا.</p>	<p>Kaletra أبوت لابوراتوريز الاسم العلمي: ٢٠٠ مليجرام لوبينافير + ٥٠ مليجرام ريتونافير (كما يباع أيضًا باسم Aluvia في بعض الدول)</p>	
<p>الأعراض الجانبية: إسهال، غثيان، قيء، طفح جلدي، صداع، داء البول السكري، يمكن تناول العقار مع الطعام أو بدونه. الجرعة المركبة مع عقار Norvir للمرضى الذين يعانون من مثبّطات البروتياز (PI) والجرعة الموصى بها هي مرتين يوميًا. يحتوي عقار Lexiva على مركبات مشتقة من السلفا.</p>	<p>قرصان ٧٠٠ مليجرام مرتين يوميًا، أو قرص ٧٠٠ مليجرام مع كبسولة من عقار Norvir مرتين يوميًا، أو قرصان ٧٠٠ مليجرام مع كبسولة ١٠٠ مليجرام من عقار Norvir مرة واحدة يوميًا. العقار متوفر في شكل شراب.</p>	<p>Lexiva ViiV Healthcare الاسم العلمي: فوساميرينافير كالسيوم (كما يباع باسم Telzir في بعض الدول)</p>	
<p>الأعراض الجانبية: غثيان، إسهال، آلام في البطن، ضعف، دوار، تخر حول الفم، تغير في حاسة التذوق، ارتفاع في مستويات ثلاثيات الغلوسريد والكوليسترول. ينبغي تناول العقار مع الطعام. يتفاعل عقار Norvir مع الأدوية الأخرى. قم بتقسيم جرعة عقار Videx في ما لا يقل عن ساعتين بين الجرعات. التبريد. إذا تعرض لدرجة حرارة الغرفة، يستخدم خلال ٣٠ يومًا.</p>	<p>٦ كبسولات ١٠٠ مليجرام مرتين يوميًا. ومتوفر في شكل شراب. كما أنه معتمد لجرعات الأطفال (للأطفال من سن شهر إلى عامين).</p>	<p>Norvir أبوت لابوراتوريز الاسم العلمي: ريتونافير</p>	
<p>الأعراض الجانبية: غثيان، إسهال، صداع، التهاب في الحلق والأنف (أعراض مشابهة للبرد). وفي بعض الحالات، طفح جلدي ما بين المُعتدل والحاد. يمكن أن يسبب العقار ارتفاعًا في الدهون وجلوكوز الدم (السكر). يُستخدم العقار بحذر مع المرضى المصابين بالهيموفيليا والمرضى الذين لديهم حساسية ضد عقاقير السلفا. يجب تناول العقار مع الطعام (بغض النظر عن كمية ونوعية الأطعمة). معتمد فقط للمرضى الذين تلقوا علاجات مضادة لمرض نقص المناعة البشرية (HIV). يمكن تخزين العقار في درجة حرارة الغرفة.</p>	<p>قرصان ٤٠٠ مليجرام مع كبسولة ١٠٠ مليجرام Norvir مرة واحدة يوميًا.</p>	<p>Prezista تيتوبتك الاسم العلمي: دارونافير</p>	
<p>الأعراض الجانبية: فرط بيليروبين الدم (يزول هذا العرض بعد التوقف عن تناول العقار)، تغير في مُعدل ضربات القلب، ارتفاع السكر، غثيان، قيء، إسهال، حُمى، صداع، وخز وتتمل في اليدين والقدمين، آلام المفاصل، حصوات الكلى. ينبغي تناول العقار مع الطعام. ويختلف عقار Reyataz عن غيره من مثبّطات البروتياز (PI) حيث إنه لا يغير نسبة الدهون في الدم. عند تناول العقار مع عقار Sustiva أو Viread، أصف Norvir إلى نظام Reyataz. في هذا المزيج، ينبغي خفض Reyataz إلى ٣٠٠ مجم يوميًا (Reyataz ٣٠٠ مجم/ Norvir ١٠٠ مجم). لا تمزج Reyataz مع Crixivan. يؤخذ بعد ساعتين من تناول مُضادات الحموضة، و ١٠ ساعات بعد مُضادات H2 ولا يتناول مع مثبّطات مضخة البروتون.</p>	<p>كبسولتان ٢٠٠ مليجرام مرة واحدة يوميًا أو كبسولة ٣٠٠ مليجرام زائد كبسولة Norvir مرة واحدة يوميًا للمرضى الذين لهم علاجات سابقة.</p>	<p>Reyataz بريستول مايرز سكويب الاسم العلمي: أتانافير</p>	
<p>الأعراض الجانبية: إسهال، غثيان، طفح جلدي، صداع، تقلصات في المعدة. ينبغي تناول العقار مع الطعام لتحسين الامتصاص. للعقار تفاعلات دوائية معينة. تحذير: حتى إشعار آخر، لا يُنصح باستخدامه من قبل الأطفال الذين بدأوا العلاج أو النساء الحوامل وذلك بسبب شوائب الأقرص.</p>	<p>قرصان ٦٢٥ مليجرام أو ٥ أقراص ٢٥٠ مليجرام مرتين يوميًا. ومتوفر في شكل مسحوق.</p>	<p>Viracept ViiV Healthcare الاسم العلمي: نيلفينافير</p>	

مثبطات الالتحام

<p>تفاعل الحساسية في مكان الحقن: حكة، تورم، احمرار، ألم، وتصلب الجلد (عمومًا، تظهر هذه التفاعلات مرة أخرى مكان الحقن في المرة القادمة). تفاعل الحساسية المُعجم: ضيق في التنفس، حمى، قيء، بول دموي، تورم القدمين، التهاب رئوي، إمساك، التهاب البنكرياس، ألم في العضلات وفقدان الشهية. وقد لوحظت هذه الآثار مُجمعة مع غيرها من مضادات الفيروسات القهقرية. لا قيود غذائية. يمكن تخزين Fuzeon® وقرابير الماء المُعجم في درجة حرارة الغرفة، من ٥٩ درجة فهرنهايت إلى ٨٦ فهرنهايت (١٥ درجة مئوية - ٣٠ درجة مئوية). إذا كانت درجة حرارة الغرفة أعلى، فإن أفضل تطبيق هو تخزين Fuzeon® في الثلجة. بمجرد مزج العقار بالماء المُعجم، يمكن تخزينه في الثلجة لمدة ٢٤ ساعة. يعتبر عقار Fuzeon® معتمد للاستخدام من قِبل المرضى الذين لديهم تجربة مع علاج مُضادات الفيروسات.</p>	<p>حقنة تحت الجلد ٩٠ مليجرام كل ١٢ ساعة.</p>	<p>Fuzeon روش أند تريميري الاسم العلمي: إنفوفيرتيد</p>	
<p>الأعراض الجانبية: سُعال، حمى، طفح جلدي، آلام العضلات والمفاصل، آلام المعدة والديوار. الأعراض الأقل تكرارًا: مشاكل الكبد، نوبات قلبية، انخفاض الضغط الوضعي، مخاطر مُحتملة للالتهابات أو الأمراض السرطانية. يُمكن تناوله مع الطعام أو بدونه. يُمزج مع مُضادات الفيروسات الأخرى. يُستحسن استخدامه من قِبل المرضى البالغين الذين عانوا من تجارب علاجية غير ناجحة مع فيروس نقص المناعة البشرية HIV-1 المُكتشف الاستوائي CCR5 والمقاومة لمضادات الفيروسات القهقرية المتعددة. قم بإجراء اختبار تفاعل الأجسام مع المؤثرات الخارجية قبل استخدام Selzentry لتحديد المُستقبلات الخلوية (CCR5 أو CXCR4).</p>	<p>قرص ١٥٠ مليجرام مرتين يوميًا، أو قرص ٣٠٠ مليجرام مرتين يوميًا أو قرصين ٣٠٠ مليجرام مرتين يوميًا (الجرعة الموصوفة تعتمد على تركيبها مع عقاقير أخرى).</p>	<p>Selzentry ViiV Healthcare الاسم العلمي: مارافيروك (كما يباع أيضًا باسم Celsentri في بعض الدول)</p>	

مثبطات الدمج

<p>الأعراض الجانبية: إسهال، غثيان، صداع. الأعراض الأقل تكرارًا: ارتفاع كيناز الكرياتين (CK)، فضلاً عن اعتلال العضلات وانحلال الرُبيدات (تدمير العضلات). يمكن تناول العقار مع أو بدون طعام. يُؤخذ مع مُضادات الفيروسات الأخرى. يُستحسن استخدام العقار من قِبل المرضى البالغين الذين عانوا في وقت مُسبق من تجارب علاجية غير ناجحة مع السلالات المقاومة لمرض نقص المناعة البشرية HIV-1 لمضادات الفيروسات القهقرية المتعددة. يُستخدم العقار بحذر عندما يُعطى مع مُحرضات الإنزيمات UGT (مثل ريفامبين) لأن مستويات رالتيجرافير تكون منخفضة.</p>	<p>قرص ٤٠٠ مليجرام مرتين يوميًا.</p>	<p>Isentress ميرك أند كيمباني الاسم العلمي: رالتيجرافير</p>	
---	--------------------------------------	--	---

التركيبات

<p>الأعراض الجانبية: للحصول على معلومات حول الآثار السلبية، يرجى الاطلاع على عقار Sustiva® (إيفافيرانز)، وعقار Emtriva® (إيمتريسيتاباين) وعقار Viread® (تينوفوفير DF). ينبغي تناول العقار بدون طعام وقبل النوم وذلك للحد من تطور الآثار الجانبية المحتملة. يخزن في درجة حرارة الغرفة.</p>	<p>قرص واحد يوميًا.</p>	<p>Atripla بريستول مايرز سكويب، جلعاد سينسيز (مزيج من إيفافيرانز ٦٠٠ مليجرام + إيمتريسيتاباين ٢٠٠ مليجرام + تينوفوفير DF 300 مليجرام، I NNRTI + I NRTI)</p>	
<p>لمزيد من المعلومات حول الأعراض الجانبية، يُرجى الاطلاع على عقار Retrovir® (AZT) وEpivir® (3TC). كن حذرًا في تناول العقار في حالات فقر الدم. التركيبات التي سبق ذكرها بالفعل ينبغي ألا توصف للمرضى الذين بحاجة لأي تعديلات في الجرعة. يمكن تناول العقار مع الطعام أو بدونه. تقل تقلصات المعدة إذا تم تناول العقار مع الطعام.</p>	<p>قرص مرتين يوميًا.</p>	<p>Combivir ViiV Healthcare (مزيج من لاميفودين ١٥٠ مليجرام + زيدوفودين ٣٠٠ مليجرام، 2 NRTI)</p>	
<p>الأعراض الجانبية الأكثر حدوثًا: اضطرابات في النوم، أحلام غريبة، صداع، دوار، إسهال، غثيان، طفح جلدي، إعياء، اكتئاب، قيء وآلام في البطن. الأعراض الجانبية الأقل حدوثًا: مشاكل في الكلى، مشاكل في العظام (منها آلام العظام، لين العظام الذي يمكن أن يؤدي إلى الكسور)، تغيرات في نسبة الدهون في الجسم. يرجى الاطلاع على قسم "ماذا عن الأعراض الجانبية؟" لكل من عقار Edurante وEpivir® وEmtriva® للتعرف على مزيد من الأعراض الجانبية المحتملة. يعتبر عقار Complera معتمد فقط للاستخدام من قِبل المرضى الذين يعانون من مرض نقص المناعة البشرية (HIV) ويبدأون علاج هذا المرض لأول مرة. يجب عدم تناول العقاقير الأخرى التي تحتوي على إيمتريسيتاباين أو لاميفودين في حالة تناول عقار Complera.</p>	<p>قرص مرة واحدة يوميًا.</p>	<p>Complera جلعاد سينسيز، جانسن ثيرابيوتيكس (يحتوي على ٢٥ مليجرام ريليفيرين + ٣٠٠ مليجرام تينوفوفير DF 300 + ٢٠٠ مليجرام إيمتريسيتاباين، I NNRTI و 2 NRTI)</p>	
<p>لمزيد من المعلومات حول الأعراض الجانبية، يُرجى الاطلاع على عقار Ziagen® وEpivir®. يمكن تناول العقار مع الطعام أو بدونه. يحتوي هذا العقار على Ziagen® (أباكافير) ويمكن أن يسبب حساسية خطيرة (يُرجى قراءة توصيات استخدام عقار Ziagen®).</p>	<p>قرص واحد يوميًا.</p>	<p>Epzicom ViiV Healthcare (مزيج من عقار أباكافير ٦٠٠ مليجرام + لاميفودين ٣٠٠ مليجرام، 2 NRTI) (كما يباع أيضًا باسم Kivexa في بعض الدول)</p>	
<p>لمزيد من المعلومات حول الأعراض الجانبية، يُرجى الاطلاع على عقار Retrovir® (AZT)، وعقار Epivir® (3TC) وعقار Ziagen® (أباكافير). يحتوي هذا العقار على Ziagen® (أباكافير) ويمكن أن يسبب حساسية خطيرة (يُرجى قراءة توصيات استخدام عقار Ziagen®). يمكن أن يؤخذ مع الطعام أو بدونه.</p>	<p>قرص واحد مرتين يوميًا.</p>	<p>Trizivir ViiV Healthcare (مزيج من عقار زيدوفودين ٣٠٠ مليجرام + لاميفودين ١٥٠ مليجرام + أباكافير ٣٠٠ مليجرام، 3 NRTI)</p>	
<p>لمزيد من المعلومات حول الأعراض الجانبية، يُرجى الاطلاع على عقار Viread® وEmtriva®. يمكن تناول العقار مع الطعام أو بدونه.</p>	<p>قرص واحد يوميًا.</p>	<p>Truvada جلعاد سينسيز (مزيج من تينوفوفير DF 300 مليجرام + إيمتريسيتاباين ٢٠٠ مليجرام، 2 NRTI)</p>	